

**A.A. 2015-2016. CORSO DI ALGEBRA 1.**  
**PROFF. P. PIAZZA, E. SPINELLI.**  
**ESERCITAZIONI. FOGLIO 5.**

**Esercizio 5.1.** Determinare le ultime tre cifre di  $n = 13^{1625}$ . (*Suggerimento. Sfruttare il Teorema di Eulero-Fermat*)

**Esercizio 5.2.** Risolvere il seguente sistema di equazioni congruenziali lineari:

$$\begin{cases} 13X \equiv 2 \pmod{21} \\ 9X \equiv 3 \pmod{10} \\ 23X \equiv 12 \pmod{43} \end{cases}$$

Risolvere lo stesso sistema sostituendo alla prima equazione la seguente:

$$7X \equiv 2 \pmod{21}$$

**Esercizio 5.3.** Stabilire per quali valori del parametro  $a$  il sistema è compatibile; per tali valori determinare la generica soluzione:

$$\begin{cases} 11X \equiv 4a \pmod{9} \\ 4X \equiv a \pmod{5} \\ 106X \equiv a + 1 \pmod{26} \end{cases}$$

**Esercizio 5.4.** Determinare le soluzioni ( $\pmod{315}$ ) del seguente sistema:

$$\begin{cases} 14X \equiv 21 \pmod{63} \\ 3X \equiv 4 \pmod{5} \end{cases}$$

**Esercizio 5.5.** Sia  $\{a_1, \dots, a_n\}$  una collezione di numeri interi:

(A) Mostrare che  $(a_1 + \dots + a_n)^3 \equiv a_1^3 + \dots + a_n^3 \pmod{3}$ ;

(B) Trovare un'espressione modulo 4 per  $(a_1 + \dots + a_n)^4$  come funzione dei soli quadrati degli  $a_i$ .

**Esercizio 5.6.**<sup>1</sup> Sia  $\varphi$  la funzione di Eulero. Per ogni intero positivo  $n$ , sia  $\omega(n)$  il numero dei fattori primi distinti di  $n$ . Dimostrare che:

$$\frac{\varphi(n)}{n} \geq \frac{1}{\omega(n) + 1}$$

(*Suggerimento. Procedere per induzione su  $\omega(n)$ . Può essere utile ricordare che dati  $m$  interi distinti  $n_1, \dots, n_m$  strettamente maggiori di 1 allora  $n_m \geq m + 1$ )*)

---

<sup>1</sup>Esercizio tratto da un compito del Prof. R. Dvornicich — Università di Pisa — A.A. 2005-2006.

**ESERCIZI PER CASA**

**Esercizio 5.7.** <sup>2</sup> Determinare le soluzioni di  $x^{27} \equiv x^{15} \pmod{77}$ . (*Suggerimento. Tradurre la precedente equazione in un sistema — sfruttare la scomposizione in primi di 77 — e risolverlo*)

**Esercizio 5.8.** <sup>3</sup> Siano  $a, b, c \in \mathbb{N}^*$  e supponiamo che valgano le seguenti:

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{c} \\ b \equiv c \pmod{a} \\ c \equiv a \pmod{b} \end{cases}$$

(A) Cosa possiamo dedurre sugli MCD delle tre coppie?

(B) Quale relazione sussiste tra  $a$ ,  $b$  e  $c$ ?

---

<sup>2</sup>Esercizio tratto da un compito del Prof. R. Dvornicich — Università di Pisa — A.A. 2005-2006.

<sup>3</sup>Esercizio tratto da *A concrete introduction to Higher Algebra* di L. N. Childs