

ESONERO DI ALGEBRA 17 GENNAIO 2019

SOLUZIONI

Esercizio 1. Sia G un gruppo di ordine 392. Dimostrare che G non è semplice.

Risulta $392 = 2^3 \cdot 7^2$, pertanto il 7-Sylow H ha indice 8. L'azione di G sui laterali di H induce un omomorfismo $\rho : G \rightarrow S_8$ che non può essere iniettivo, perché 392 non divide $8!$. Dunque $\ker \rho$ è un sottogruppo normale non banale di G , che pertanto non è semplice.

Esercizio 2. Dimostrare che S_4 non contiene sottogruppi abeliani con 8 elementi.

I sottogruppi di ordine 8 in S_4 sono i 2-Sylow, dunque sono tutti coniugati, in particolare isomorfi. Se prendiamo il gruppo D_4 delle simmetrie di un quadrato Q , ogni suo elemento permuta i vertici di Q e li fissa tutti se e solo è l'identità. Otteniamo un omomorfismo iniettivo di D_4 in S_4 e quindi ogni sottogruppo di ordine 8 in S_4 non è abeliano in quanto isomorfo a D_4 .

Esercizio 3. Si consideri il polinomio

$$f(x) = x^4 + 14x^3 - 8x^2 + 10x - 2.$$

Si decomponga $f(x)$ in fattori irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{Z}/3[x]$ e $\mathbb{Z}/5[x]$.

$f(x)$ è irriducibile su \mathbb{Q} per il criterio di Eisenstein (applicabile con $p = 2$), mentre si fattorizza come $f(x) = (x + 1)(x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ in $\mathbb{Z}/3[x]$ e come $f(x) = (x + 2)(x + 4)^3$ in $\mathbb{Z}/5[x]$.

Esercizio 4. Sia I l'ideale di $\mathbb{Z}[i]$ generato da $20 + 35i$ e $10 - 45i$. Determinare gli ideali primi che lo contengono.

Gli ideali cercati sono quelli generati dai fattori primi di $MCD(20 + 35i, 10 - 45i)$. Osserviamo che $20 + 35i = 5(4 + 7i) = (2 + i)(2 - i)(4 + 7i)$, $10 - 45i = 5(2 - 9i) = (2 + i)(2 - i)(2 - 9i)$. Ne segue che fra i fattori primi ci sono quelli che dividono 5 ovvero $1 + 2i$ e $1 - 2i$. Dobbiamo considerare ora quelli che dividono $MCD(4 + 7i, 2 - 9i)$.

$\|4 + 7i\| = 65 = 5 \times 13$ e $\|2 - 9i\| = 85 = 5 \times 17$. Dato che 13 e 17 sono coprimi, $MCD(4 + 7i, 2 - 9i)$ divide 5. Ma i divisori di 5 li abbiamo già presi e quindi gli ideali primi che contengono I sono quelli generati da $1 + 2i$ e $1 - 2i$.

Esercizio 5. Si consideri il campo $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$. Si determini $[L : \mathbb{Q}]$ e si trovino un elemento primitivo e una base di L su \mathbb{Q} .

Osserviamo che $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2})(i)$. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ è reale dunque non contiene i quindi

$$L \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supseteq \mathbb{Q}.$$

Essendo $\sqrt{2}$ radice di $x^2 - 2$ e i di $x^2 + 1$ le estensioni $L \supseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ e $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supseteq \mathbb{Q}$ hanno entrambe grado 2. Pertanto $[L : \mathbb{Q}] = 4$ e una base di L su \mathbb{Q} è data da $1, \sqrt{2}, i, i\sqrt{2}$. Ora

$$(x - \sqrt{2} - i)(x - \sqrt{2} + i)(x + \sqrt{2} - i)(x + \sqrt{2} + i) = (x^2 + 3 - 2\sqrt{2}x)(x^2 + 3 + 2\sqrt{2}x) = x^4 - 2x^2 + 9$$

Questo polinomio è irriducibile su \mathbb{Q} . In effetti non ha radici razionali e neanche fattori razionali di grado 2.

Dunque $x^4 - 2x^2 + 9$ è il polinomio minimo di $\sqrt{2} + i$ che è quindi primitivo.

Esercizio 6. Sia K un campo e $K(\alpha) \supset K$ un'estensione tale che $[K(\alpha) : K]$ è dispari. Dimostrare che $K(\alpha^2) = K(\alpha)$.

Risulta $[K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K(\alpha^2)][K(\alpha^2) : K]$. Inoltre $[K(\alpha) : K(\alpha^2)] \leq 2$, perché α è radice del polinomio $x^2 - \alpha^2 \in K(\alpha^2)[x]$. La relazione precedente e l'ipotesi che $[K(\alpha) : K]$ è dispari implicano $[K(\alpha) : K(\alpha^2)] = 1$, ovvero $K(\alpha) = K(\alpha^2)$.