

Geometria 1. Gruppo E-N. Anno Accademico 2000-2001.

Alcuni preliminari. Risposte.

Risposta 1 “Sta piovendo” \Rightarrow “la strada è bagnata”.

Risposta 2 Non c'è alcuna differenza. Anche questa proposizione si traduce in : “Sta piovendo” \Rightarrow “la strada è bagnata”.

In generale la proposizione $A \Rightarrow B$ si può tradurre indifferentemente con una delle seguenti due proposizioni

1) *Condizione necessaria affinché A sia vero è che sia verificato B .*

2) *Condizione sufficiente affinché B sia vero è che sia verificato A .*

Osserviamo anche che una condizione sufficiente “implica” mentre una condizione necessaria “è implicata”.

Risposta 3 La proposizione si può scrivere “la strada è bagnata” \Rightarrow “sta piovendo”. È chiaramente falsa.

In generale la veridicità di $A \Rightarrow B$ non fornisce alcuna informazione circa la veridicità della proposizione $B \Rightarrow A$.

Risposta 4 “se la strada è asciutta” ne segue che “non sta piovendo”.

Questo è un esempio della regola di contrapposizione: $A \Rightarrow B$ è equivalente a (negazione di B) \Rightarrow (negazione di A).

Risposta 5 1) Le implicazioni sono : “ n^2 pari $\Rightarrow n$ pari” e “ n pari $\Rightarrow n^2$ pari”.

2) n^2 pari $\Leftrightarrow n$ pari.

Osservazione. La proposizione “ $A \Leftrightarrow B$ ” si può anche esprimere dicendo che “ A è equivalente a B ” oppure “ A è vera se e soltanto se B è vera”.

3) “ n è pari” è sia condizione necessaria che condizione sufficiente. Se si volesse dimostrare la veridicità della condizione necessaria si dovrebbe dimostrare che n^2 pari $\Rightarrow n$ pari. Se si volesse invece dimostrare la veridicità della condizione sufficiente allora si dovrebbe far vedere che n pari $\Rightarrow n^2$ pari.

Risposta 6 1) La proposizione è ovviamente falsa perché se Paola è in Italia non è detto che sia a Roma.

2) “Paola è a Roma” \Rightarrow “Paola è in Italia” (e cioè la condizione necessaria) è vera. Mentre è falso che “Paola è in Italia” \Rightarrow “Paola è a Roma” (la condizione sufficiente).

Risposta 7 1) $\mathcal{P}1: \exists x \in \mathbb{Q} \ x \neq 0 \mid \forall y \in \mathbb{Q}, \ xy = 1$

2) La proposizione è falsa. Per dimostrarlo bisogna far vedere che non esiste una $x \in \mathbb{Q}$ con la proprietà enunciata. In altre parole, scelto comunque un numero razionale $x \neq 0$ basterà far vedere che esiste un y' tale che $xy' \neq 1$. Dato che $x \neq 0$ si può scegliere per esempio $y' = \frac{1}{2x}$ in modo tale che $xy' = \frac{1}{2} \neq 1$.

Osservazione. Abbiamo dimostrato: $\forall x \in \mathbb{Q} \ x \neq 0 \ \exists y' \in \mathbb{Q} \mid xy' \neq 1$ cioè la negazione di $\mathcal{P}1$. È importante capire questo punto:

Negare : $\forall x$ è valida la proposizione \mathcal{P} è equivalente a affermare : $\exists x$ per cui non è valida la proposizione \mathcal{P} .

Negare : $\exists x$ per cui è valida la proposizione \mathcal{P} è equivalente a affermare : $\forall x$ non è valida la proposizione \mathcal{P} .

Esercizio:

1) Negare : $\forall x \exists y \mid$ è valida la proposizione \mathcal{P}

2) Negare : $\exists x \mid \forall y$ è valida la proposizione \mathcal{P}

3) Negare : $\forall x \exists y \mid \forall z$ è valida la proposizione \mathcal{P}

Soluzione esercizio.

1) $\exists x \mid \forall y$ non è valida \mathcal{P} .

2) $\forall x \exists y \mid$ non è valida \mathcal{P} .

3) $\exists x \mid \forall y \exists z \mid$ non è valida \mathcal{P} .