

**Esercizio 1.** In  $V = \mathbb{R}^3$  si considerino il sottospazio  $U$  generato dai vettori

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

e il sottospazio  $W$  di equazione  $kx + y + (k - 2)z = 0$ . Determinare, al variare di  $k$  in  $\mathbb{R}$ , la dimensione ed una base del sottospazio  $U \cap W$  di  $V$ .

**Esercizio 2.** Sia  $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$  lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a  $n$ .

- (1) Mostrare che i tre vettori  $e_1 = x + 1$ ,  $e_2 = x + 2$ ,  $e_3 = x^2 + x + 1$  formano una base di  $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ ;
- (2) Mostrare che i due vettori  $f_1 = x + 3$ ,  $f_2 = x + 4$  formano una base di  $\mathbb{R}[x]_{\leq 1}$ ;
- (3) Scrivere la matrice che rappresenta l'applicazione lineare

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} &\rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 1} \\ p(x) &\mapsto p(x + 1) - p(x - 1) \end{aligned}$$

rispetto alle basi  $\{e_1, e_2, e_3\}$  e  $\{f_1, f_2\}$ .

- (4) determinare la dimensione del nucleo e dell'immagine di  $\varphi$ .

**Esercizio 3.** Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- (1) determinare il polinomio caratteristico e gli autovalori di  $A$ ;
- (2) per ogni autovalore, determinare la dimensione ed una base del rispettivo autospazio.
- (3) dire se  $A$  è diagonalizzabile
- (4) determinare il polinomio minimo di  $A$ .

**Esercizio 4.** Siano  $V$  uno spazio vettoriale di dimensione finita sul campo dei numeri complessi e  $f: V \rightarrow V$  un endomorfismo lineare. Si assuma che  $U \subset V$  sia un sottospazio vettoriale proprio  $f$ -invariante, ossia tale che  $f(U) \subseteq U$ . Dimostrare che esiste un iperpiano  $H \subset V$  tale che  $U \subseteq H$  e  $f(H) \subseteq H$ . (Ricordiamo che un sottospazio  $H$  si dice un iperpiano se  $\dim H = \dim V - 1$ .)

**Esercizio 5.** Sia  $B \in M_{n,n}(\mathbb{K})$  una matrice fissata e sia

$$\Phi: M_{n,n}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,n}(\mathbb{K}), \quad \Phi(A) = AB + B^2A.$$

- (1) Mostrare che  $\Phi$  è lineare e calcolare  $\Phi^2(A)$ .
- (2) Se  $B$  è nilpotente, provare che  $\Phi^m = 0$  per ogni intero  $m \geq \frac{3n}{2}$ .
- (3) Se  $q_B(t) = t^k$  è il polinomio minimo di  $B$ , provare che, dato un polinomio  $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ , vale  $p(B) \in \text{Ker}(\Phi)$  se e solo se  $p(t)$  è divisibile per  $t^{k-1}$ .