

ESERCIZI DI GEOMETRIA (Per FISICI)
CORSO DEL PROF. RENZO MAZZOCCO
A.A. 2010-2011
Foglio N. 4

1. Spazi vettoriali reali V di dimensione tre e W di dimensione quattro. Basi $B_V=(v_1, v_2, v_3)$ e $B_W=(w_1, w_2, w_3, w_4)$. Sia $F:V \rightarrow W$ l'applicazione lineare tale che

$$F(v_1)=2w_1-w_2+w_3, \quad F(v_2)=-w_1+2w_2-w_4, \quad F(v_3)=w_1+w_2+w_3-w_4.$$

- (a) Determinare la matrice e le equazioni di F rispetto alle basi B_V e B_W .
- (b) Determinare il nucleo e l'immagine di F .
- (c) Dire se F è iniettiva e/o surgettiva.

2. Spazi vettoriali numerici reali $V=R^3$ e $W=R^2$. Assegnata la matrice A di righe

$$A^{(1)}=(1,1,1)$$

$$A^{(2)}=(1,1,-1),$$

si consideri l'applicazione lineare $F:V \rightarrow W$ associata ad A rispetto alle basi canoniche di V e W .

- (a) Scrivere l'espressione di $F(v)$ rispetto alle basi canoniche di V e W .
- (b) Calcolare il rango di A e dedurre se F è iniettiva e/o surgettiva.

3. Spazio vettoriale reale V di dimensione tre. Base $B=(v_1, v_2, v_3)$. Assegnati gli endomorfismi $F:V \rightarrow V$ e $G:V \rightarrow V$, definiti rispettivamente da

$$F(v)=(x_1-x_2+x_3)v_1+(x_1+x_2)v_2+(x_1+x_3)v_3$$

e

$$G(v)=(x_1+x_2+2x_3)v_1+(x_1-x_3)v_2+(2x_1+2x_3)v_3,$$

essendo $v=x_1v_1+x_2v_2+x_3v_3$, si consideri il prodotto operatorio $G \circ F: V \rightarrow V$.

- (a) Determinare la matrice C associata all'endomorfismo $G \circ F$ rispetto alla base B .
- (b) Determinare il nucleo e l'immagine di $G \circ F$.
- (c) Dire se $G \circ F$ è un automorfismo.

4. Spazio vettoriale numerico reale $V=R^2$. Sia assegnata l'applicazione $F:V \rightarrow V$ definita da

$$F(v)=(x_1+x_2, x_1-x_2),$$

essendo $v=(x_1, x_2)$.

- (a) Verificare che F è un automorfismo.
- (b) Considerato l'automorfismo inverso $F^{-1}:V \rightarrow V$, scrivere l'espressione di $F^{-1}(v)$ rispetto alla base canonica di V .

5. Spazio vettoriale $V=M_2(R)$ delle matrici quadrate reali del secondo ordine. Sia assegnata l'applicazione $F:V \rightarrow V$, definita da

$$F(A)=(1/2)(A+A^t),$$

essendo $A \in V$.

- (a) Verificare che F è un endomorfismo di V .
- (b) Determinare la matrice associata ad F rispetto alla base canonica di V e scrivere le equazioni di F rispetto a tale base.
- (c) Determinare il nucleo e l'immagine di F .
- (d) Dire se F è un automorfismo.

6. Spazio vettoriale numerico reale $V=R^3$. Sia assegnato l'endomorfismo $F:V \rightarrow V$ definito da

$$F(v)=(-x_1-3x_2-3x_3, 5x_2+6x_3, -3x_2-4x_3),$$

essendo $v=(x_1, x_2, x_3)$.

- (a) Determinare la matrice A associata ad F rispetto alla base canonica di V .
- (b) Verificare che l'endomorfismo F è diagonalizzabile.

- (c) Determinare una base B' di V costituita da autovettori rispetto ad F .
- (d) Detta A' la matrice associata ad F rispetto alla base B' , determinare una matrice non singolare C tale che $A'=C^{-1}AC$.
- (e) Scrivere l'espressione di $F(v)$ rispetto a B' .

7. Spazio vettoriale reale V di dimensione tre. Base $B=(v_1, v_2, v_3)$. Sia $F:V \rightarrow V$ l'endomorfismo tale che

$$F(v_1)=3v_1+2v_2+3v_3, F(v_2)=2v_1+2v_3, F(v_3)=-v_1-2v_2-v_3.$$

- (a) Determinare la matrice A associata rispetto alla base B .
- (b) Determinare gli autovalori con le rispettive molteplicità algebrica e geometrica.
- (c) Dire se F è diagonalizzabile.

8. Spazio vettoriale numerico reale $V=R^4$. Sia $F:V \rightarrow V$ l'endomorfismo definito da

$$F(v)=(-x_1, 3x_2, 4x_2-x_3, x_4),$$

essendo $v=(x_1, x_2, x_3, x_4)$.

- (a) Determinare la matrice A associata a F rispetto alla base canonica di V .
- (b) Determinare gli autovalori di F con le rispettive molteplicità algebrica e geometrica e dedurre che F è diagonalizzabile.
- (c) Detta A' la matrice associata ad F rispetto alla base B' , determinare una matrice non singolare C tale che $A'=C^{-1}AC$.
- (d) Scrivere l'espressione di $F(v)$ rispetto a B' .

9. Siano assegnate la matrice quadrata reale A di righe

$$A^{(1)}=(1,0,0)$$

$$A^{(2)}=(0,1,1)$$

$$A^{(3)}=(0,0,1)$$

e la matrice quadrata reale B di righe

$$B^{(1)}=(1,0,0),$$

$$B^{(2)}=(0,0,1),$$

$$B^{(3)}=(0,1,0).$$

- (a) Verificare che le matrici A e B sono invertibili.
- (b) Determinare le matrici inverse A^{-1} e B^{-1} .
- (c) Verificare se le matrici A e B sono o non sono diagonalizzabili.
- (d) Dire se le matrici $B^{-1}AB$ e $A^{-1}BA$ sono o non sono diagonalizzabili.

10. Spazio vettoriale numerico reale $V=R^3$. Sia assegnata la matrice quadrata reale A di righe

$$A^{(1)}=(-4-k, 0, -4-2k)$$

$$A^{(2)}=(0, -2, 0)$$

$$A^{(3)}=(2+k, 0, 2+2k),$$

essendo k un parametro reale.

- (a) Determinare il valore k_0 del parametro tale che la matrice corrispondente, che indicheremo soltanto con A , ammetta un autovalore coincidente con 0 .
- (b) Verificare che la matrice A è diagonalizzabile.
- (c) Determinare una base di V costituita da autovettori rispetto ad A .
- (d) Determinare una matrice non singolare C tale che $C^{-1}AC$ sia una matrice diagonale.